

STORM

Racun tikus sekali makan jenis
“antigumpal”

INTRODUCTION

STORM® is a potent anticoagulant rodenticide. **STORM®** will kill rats and mice following a single feed but death occurs after several days and so bait shyness and the need for pre-baiting are avoided. Most infestations will be controlled in 21 days. **STORM®** is ready to use and does not require addition of other food stuffs.

PENGENALAN

STORM® merupakan racun tikus jenis ‘antigumpal’ yang berkesan. **STORM®** membunuh tikus dengan sekali makan dan tikus akan mati selepas beberapa hari. Kebanyakan serangan dapat dikawal dalam tempoh 21 hari. **STORM®** ialah racun tikus sedia digunakan dan tidak perlu dicampurkan dengan bahan-bahan makanan lain.

Single feed
anticoagulant
rodenticide



Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)
2, Jalan U8/87, Seksyen U8, Bukit Jelutong, 40706 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

® Tanda Dagangan BASF

Agricultural Products

BASF

The Chemical Company

JIRP.P/1107/709

BACALAH LABEL KELUARAN SEBELUM MENGGUNAKANNYA.



FEATURES

- **One feeding is all it takes to kill the rat**

One (four (4) gram) bait packs enough active ingredient to kill one rat.

- **Suitable for 'pulse' baiting**

Apply Storm in 'pulses'. Most rats would have eaten the bait in the first pulse or application round. Wait for about 7 days for Storm to act before applying the second pulse for rats missed in the first pulse.

- **Convenient block size**

The blue (four (4) gram) block is easy to use and place. Its blue color makes it easily identified among leaf litter and loose fruits. It formulation is also resistant to mould, insects and moisture.

- **Good palatability to rats and mice**

Storm is as attractive to rats as oil palm fruits, papaya, banana, meat, bread/milk.

- **Contains human taste deterrent**

Storm contains a bitter taste to reduce accidental poisoning especially among young children.



FORMULATION

STORM® ready-to-use bait is available as a grain-based formulation containing 50ppm (0.005%) flocoumafen. The principal commercial formulation is the wax bound block.



STORM® Rat Bait / Umpan Tikus **STORM®**



DIRECTIONS FOR USE ATURAN MENGGUNAKANNYA

Oil Palm: Place one bait at the base of each palm when the monthly census show more than 5% fresh fruit damage. Replace all baits taken weekly until bait replacement is brought down to 20%.



Kesan Serangan Tikus Ke atas Buah Kelapa Sawit

Kelapa Sawit: Letakkan seketul umpan di pangkal setiap pokok kelapa sawit apabila banci bulanan menunjukkan kerosakan buah melebihi 5%. Setiap minggu, umpan yang telah dimakan diganti dengan yang lain hingga alih umpan yang perlu diganti 20% sahaja.

Cocoa: Commence baiting when rat damage exceed 50 pods/ ha. Place one bait at base of every 5th tree and replace all bait taken weekly until bait replacement is brought down to 20%.



Kesan Serangan Tikus Ke atas Buah Koko

Koko: Mula letakkan umpan ini apabila buah yang rosak melebihi 50 biji sehektar. Letakkan umpan di pangkal setiap pokok yang kelima dan setiap minggu, umpan yang telah dimakan diganti dengan yang lain hingga alih umpan yang perlu diganti 20% sahaja.

Padi: Place one bait every 10 to 15 m on bund and in front of burrows, before sowing or transplanting, followup baiting should be done two weeks after sowing or transplanting and subsequently replace baits taken weekly until bait replacement is brought down to 20%.

Padi: Letakkan seketul umpan setiap 10m hingga 15m di atas batas dan di hadapan lubang tikus, sebelum menabur biji benih atau sebelum mengubah. Pengumpunan berikutnya dilakukan dua minggu selepas proses menabur atau menanam. Setiap minggu, umpan yang telah dimakan diganti dengan yang lain hingga alih umpan yang perlu diganti 20% sahaja.